

ПРОФИЛАКТИКА КОКЛЮШНОЙ ИНФЕКЦИИ

Возбудителем заболевания "Коклюш" является бактерия *Bordetella pertussis*. Передаётся воздушно-капельным путём, редко - через контакт с заражёнными предметами. Заболевшие перестают быть заразными через 3 недели от начала заболевания.



Группами риска являются дети в возрасте до 2 лет, пожилые люди.



Рост заболеваемости связан:

1. со снижением иммунитета у ранее вакцинированных подростков и взрослых
2. с отказом родителей вакцинировать детей

ОСЛОЖНЕНИЯ:

- асфиксия (распространена среди младенцев)
- средний отит
- бронхопневмония (распространена среди пожилых людей)
- кровоизлияние в мозг, с последующей гипоксией
- пупочная грыжа

СИМПТОМЫ:



Цель вакцинации против коклюша состоит в **снижении риска тяжелого заболевания** среди детей младенческого и раннего возраста. Для этого Национальном календарём профилактических прививок предусмотрена **вакцинация в возрасте 2,3,4 месяцев** и **ревакцинация в 18 месяцев** комплексной вакциной, в состав которой также входят дифтерийный и столбнячный компоненты (АКДС). Также рекомендована вакцинация для беременных женщин для защиты новорожденных, еще не подлежащих вакцинации по возрасту, за счет материнских антител.

